


CUIDADOS A TER

NA MANUTENÇÃO DAS
ARMADILHAS PARA O
ESCARAVELHO VERMELHO
DA PALMEIRA

(*Rhynchophorus ferrugineus*)



Para evitar que as armadilhas para o escaravelho vermelho da palmeira (*Rhynchophorus ferrugineus*) se tornem criadouros de mosquitos, deve:

Colocar água salgada nas armadilhas



+



ou



e



adicionar sal à água da torneira, na proporção de 35g de sal por cada litro de água.

utilizar água do mar.



pelo menos uma vez por semana, lavar e esfregar os recipientes de água.

evitando assim que o mosquito *Aedes aegypti*
complete o seu **ciclo de vida**

Ciclo de vida do mosquito

Aedes aegypti

O *Aedes aegypti* tem um ciclo de vida complexo, passando por duas fases distintas: uma fase aquática (ovo, larva e pupa) e uma fase aérea (mosquito adulto).



ovo



larva



pupa

A fase aquática completa do ciclo de vida do *Aedes aegypti* dura entre 5 a 10 dias, dependendo de condições ambientais como a temperatura e precipitação.

Na fase aérea, o mosquito pode viver, em média, de 30 a 45 dias.



Habitat

Os recipientes de água, naturais ou artificiais (depósitos de água, baldes, latas, caleiras, fontes ornamentais, bidões, vasilhas de água para os animais, pneus, buracos de árvore, buracos nas rochas, bromélias, etc.) que estão dentro ou próximos dos locais de habitação, são os habitats ideais para a fase aquática deste mosquito. Além dos recipientes habituais, esta espécie também é encontrada em sarjetas, grelhas de escoamento de água e armadilhas para outros animais que contenham água.