

# PROTEGIDO PARA RESPIRAR BEM



Região Autónoma  
da Madeira  
Governo Regional

Anticorpo contra o Vírus Sincial Respiratório



## PREVENIR A DOENÇA GRAVE E A HOSPITALIZAÇÃO POR VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

### Imunização Anti-VSR Época 2024-25

- ✿ Crianças nascidas no período de 1 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025. Fazem a imunização no hospital, após o nascimento. Crianças nascidas em outras maternidades (fora do SESARAM, EPERAM) serão imunizadas nos Centros de Saúde da área de residência.
- ✿ Crianças nascidas no período de 1 de abril a 30 de setembro de 2024 serão convocadas para serem imunizadas nos Centros de Saúde da área de residência.
- ✿ Crianças com risco acrescido de doença grave por VSR, na 2ª época de circulação do vírus, até os 24 meses, serão imunizadas na consulta de profilaxia do VSR do Hospital Dr. Nélcio Mendonça.

## **O vírus sincicial respiratório (VSR)**

É um vírus respiratório que circula entre o outono e a primavera. É comum e muito contagioso, infectando a maioria das crianças nos primeiros dois anos de vida. É uma das principais causas de bronquiolite e pneumonia e a principal causa de hospitalização durante o primeiro ano de vida.

### **Transmissão**

Acontece através de secreções orais ou nasais, de pessoa para pessoa, ao tossir ou espirrar, ou por contato com superfícies contaminadas.

### **Sintomas**

Os sintomas são frequentemente leves e semelhantes aos de uma constipação. Todavia, a doença pode progredir afetando significativamente as vias respiratórias baixas e exigindo cuidados médicos.

### **Tratamento**

Atualmente, não existe um tratamento específico para a infecção por VSR, sendo a atenção dirigida para o alívio dos sintomas.

### **Prevenção**

Inclui medidas ambientais e de higiene, como a lavagem das mãos, a lavagem frequente de brinquedos, roupas e superfícies de contacto e a redução das visitas, do toque e dos beijos às crianças. A imunização passiva é possível através de um anticorpo anti-VSR, sendo a proteção da criança imediata.

### **Imunização**

Uma dose única do anticorpo anti-RSV é administrada no início da época de circulação do vírus, conferindo proteção durante 150 dias. A administração é feita no músculo da região anterolateral da coxa.

**Esta imunização está indicada para todas crianças, na sua primeira época de VSR.** Às crianças com risco acrescido de doença grave por VSR é administrada uma 2ª dose do anticorpo na 2ª época de circulação do vírus, até os 24 meses.

**Se o seu filho estiver protegido,  
você também respira de alívio.**