

Esquemas Vacinais Recomendados

Adaptação / Norma no 002/2021 de 30/01/2021 atualizada 11/01/2022



História de Infecção SARS-CoV-2	Esquema vacinal primário (Fases 1, 2 e 4)				Reforço (Fase 3) (g)	
	Dia de início do esquema vacinal	4 semanas após 1ª dose	8 semanas após 1ª dose	Pelo menos, 3 meses pós-infecção	Vacinados com JAN 3 meses após última dose/infecção	Vacinados com COM, SPI, VAX 6 meses após última dose/infecção (mínimo 5 meses)
Não	COM 1	COM 2 (a)				COM 3
	SPI 1	SPI 2				SPI 3
	VAX 1 (b)		VAX 2 (b)(c)			COM 3 ou SPI 3
	JAN (d)				COM 2 ou SPI 2	
Infecção antes da 1ª dose				COM 1 (e)		COM 2 (f)
				SPI 1 (e)		SPI 2 (f)
				VAX 1 (e)		COM 2 (f) ou SPI 2 (f)
				JAN	COM 2 ou SPI 2	
Infecção após a 1ª dose (COM 1, SPI 1, VAX 1)	COM 1			COM 2		COM 3
	SPI 1			SPI 2		SPI 3
	VAX 1 (b)			VAX 2 (b)(c)		COM 3 ou SPI 3
	JAN (d)				COM 2 ou SPI 2	
Infecção após esquema vacinal completo	COM 1	COM 2 (a)				COM 3
	SPI 1	SPI 2				SPI 3
	VAX 1 (b)		VAX 2 (b)(c)			COM 3 ou SPI 3
	JAN (d)				COM 2 ou SPI 2	

Legenda: **COM** = COMIRNATY; **SPI** = SPIKEVAX (MODERNA); **VAX** = VAXZEVRIA; **JAN** = JANSSEN

- (a) **COM**: Esquema recomendado: 21 – 28 dias para as pessoas com ≥ 12 anos de idade; 6-8 semanas (42-56 dias) para as pessoas com 5 a 11 anos de idade.
- (b) **VAX**: Administrada apenas a pessoas com 60 ou mais anos de idade, nos termos da Norma 003/2021 da DGS
- (c) **VAX**: As pessoas com menos de 60 anos de idade que foram vacinadas com a 1ª dose de VAX, devem fazer a 2ª dose com vacina COM ou SPI, nos termos da Norma 003/2021 da DGS
- (d) **JAN**: Nas pessoas do sexo feminino, só deve ser administrada aos 50 ou mais anos de idade, nos termos da Norma 004/2021 da DGS
- (e) As pessoas com imunossupressão devem cumprir o esquema completo recomendado, de acordo com a vacina utilizada, respeitando o intervalo de, pelo menos, 3 meses/90 dias após a infeção
- (f) Após a infeção, algumas pessoas, em situações especiais (ex: imunossuprimidos, pessoas em ERPI, viajantes) receberam 2 doses de vacina. A dose administrada 5 ou mais meses após a 1ª dose é considerada como reforço
- (g) **SPI**: A dose de reforço é constituída por 0,25 mL. As pessoas em condições de imunossupressão, que fizeram uma dose adicional, à data, não são elegíveis para dose de reforço