

Serviço Regional de Avisos Agrícolas

N.º: 10

Data: 2024/08/01

Sumário:

BANANA: ÁCAROS

CEREJA: LARVA LESMA

BANANA

ÁCAROS - *Tetranychus Urticae* (aranhiço cinzeiro)

Com o aumento da temperatura e a redução da humidade do ar, tem sido observado nas explorações agrícolas um crescimento muito acentuado da população de ácaros, que provocam graves prejuízos nos cachos de bananas, com perda de valor comercial e consequente perda de rendimento para os produtores.

Quando as temperaturas começaram a aumentar, os ácaros deixam de estar em hibernação e começaram a se multiplicar, sendo necessário vigiar com maior frequência as parcelas durante todo o verão.

Esteja sempre atento, observe regularmente as folhas e com maior cuidado os cachos das bananeiras, inclusive os ráquis Fig.3, onde estes organismos estão frequentemente refugiados.



Fig.3 Ráquis com ácaros



Fig. 1 e 2 Bagos de banana com elevada população de ácaros

Edição e distribuição: Divisão de Inovação Agroalimentar
Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural

Redação: Divisão de Inovação Agroalimentar

Contacto: 291 145 405
sraa.dra@madeira.gov.pt

Monitorização de pragas, doenças e
desenvolvimento das culturas:

Divisão de Assistência Técnica Agronómica
Divisão de Agricultura Biológica
Divisão de Experimentação e Melhoria Agronómica
Divisão de Inovação Agroalimentar
IVBAM, IP-RAM - Divisão de Viticultura

A observação na banana de zonas de cor branca prateada que podem ficar acastanhadas com o passar do tempo e a presença de pequenas “teias de aranha” entre os bagos são um bom indicador da presença desta praga Fig.4 e 5.




Fig.4 e 5 Bagos de banana com pequenas teias entre os bagos, sintomas da presença de ácaros

Para evitar o aumento da população desta praga, é importante ter em atenção as medidas culturais recomendadas:

- Promover o arejamento da plantação, com a limpeza das folhas das bananeiras e a manutenção do compasso de plantação de 4 a 5 m² por planta com a seleção das canhotas atempadamente. Os cachos devem ficar sempre bem arejados;
- Evitar ter próximo da sua plantação outras culturas, como aboboreiras ou pimpenleiras, que proporcionam condições para o desenvolvimento desta praga;
- Para facilitar a monitorização da praga e aumentar o arejamento do cacho, é recomendado não colocar sacos nos meses mais quentes quando as condições são favoráveis ao crescimento da praga.

Meio de Luta química

Quando necessário, aplique um inseticida/acaricida dirigida ao cacho e às folhas posicionadas em volta do cacho.

Existem diversas alternativas autorizadas para controlo dos ácaros na cultura da bananeira, mas tenha atenção à aplicação de produtos fitofarmacêuticos à base de enxofre ou de óleos, uma vez que mancham facilmente a banana, que perde valor comercial.



Fig.6 Bagos de banana com sintomas de queimadura por aplicação de óleos

Se observar na sua plantação de bananeiras, prejuízos provocados pelos ácaros que são facilmente identificados pelos sintomas muito característicos anteriormente explicados, aplique

- THIOVIT JET (AV 1998) - 20 a 40 g/10 L de água

respeite o intervalo de segurança de 1 dia;

OU

- MILBECNOCK (AV 318) - 15ml/10L,

respeite o Intervalo de segurança de 1 dia

Pode consultar todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados/homologados para a cultura da bananeira no site da DGAV: SIFITO- Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos Sifito
<https://sifito.dgav.pt/>

CEREJA

LARVA LESMA (*Caliroa cerasi*)

A cultura da cerejeira no Jardim da Serra nesta campanha teve uma produção quase nula.

O ciclo vegetativo da espécie continua e as pragas e doenças também. Neste caso é o caso da larva lesma (*Caliroa cerasi* L.) que já começou a fazer estragos, conforme Fig.7 e 8.

É urgente a aplicação de um produto fitofarmacêutico homologado para fazer face a esta situação de forma a diminuir o ataque e

enfraquecimento das plantas, uma vez que a larva lesma se alimenta das folhas.

Os meios de controlo são tratamentos químicos à base de enxofre. Deverá fazer um tratamento ao aparecimento dos primeiros sintomas, na primavera, verão e outono, após a colheita dos frutos.



Fig.7 Copa parcialmente atacada pela larva lesma em folhas de cerejeira



Fig.8 Larva lesma em folhas de cerejeira

Os produtos homologados são o Thiovit Jet, 200 a 400g/hl e Bago de ouro 98,5%, 1 a 5kg/1 000m².

A pulverização e a polvilhação deverão ser dirigidas à copa da árvore.

RELEMBRAMOS A OBRIGATORIEDADE DO REGISTO DE TODAS AS APLICAÇÕES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS.

Os produtos fitofarmacêuticos autorizados / homologados para a cultura, podem ser consultados no site da DGAV: SIFITO - Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos - <https://sifito.dgav.pt>

**Para mais informações contacte a
Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural através do
telefone 291145 454
email: dra@madeira.gov.pt ou no
Balcão do Agricultor mais próximo**